

NR 06/2020

katalog Produktów

Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Alergia

9⁹⁹



ALERIC DESLO ACTIVE 10 tabletek

Produkt leczniczy • Tabletki, 10 sztuk • Desloratadyna 5 mg • Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. **Wskazania do stosowania:** u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat, w celu łagodzenia objawów związanych z: - alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa; - pokrzywką. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę. **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o.

Witaminy i minerały

37⁹⁹*



OLIMP THERM LINE FORTE 60 kapsułek

Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • Suplement diety w kapsułkach zawierający opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i nasion guarany – Sinetrol oraz zaawansowany kompleks – Thermo Blend. Sinetrol został przebadany klinicznie¹. Występująca w nim m.in. guarana, wpływa na metabolizm tłuszczów. Składniki zawarte w Thermo Blend, takie jak ekstrakt zielonej herbaty wspierający proces termogenezy oraz chrom przyczyniający się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych sprawiają, że Therm Line® forte jest idealną propozycją dla osób odchudzających się. **Producent:** OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica.

Trawienie

14⁹⁹*



lżej trawisz

Kreon® Travix – informacja o leku.

Nazwa produktu leczniczego: Kreon Travix, 10 000 J. Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe. **Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej:** Pankreatyna (Pancreatinum). **Dawka/stężenie substancji czynnej:** 1 kapsułka produktu Kreon Travix zawiera jako substancję czynną 150 mg pankreatyny (Pancreatinum) o aktywności: amylazy 8 000 J. Ph.Eur. (J. 8P), lipazy 10 000 J. Ph.Eur. (J. 8P), proteazy 800 J. Ph.Eur. **Postać farmaceutyczna:** Kapsułka dojelitowa. Kapsułka żelazny owal, zawierająca granulki w otoczce odpornej na działanie soku żołądkowego (minimikroperle). Kapsułka są dwukolorowe: jedna część jest nieprzezroczysta brązowa, druga przezroczysta bezbarwna. **Wskazania lub wskazania terapeutyczne do stosowania:** Leczenie zaburzeń trawienia w przebiegu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych, której wystąpienie jest związane z poniżej wymienionymi lub innymi jednostkami chorobowymi: zwiększenie torbielotwórczości (mukowiscydoza), pierwotne zapalenie trzustki, stan po usunięciu trzustki (pankreatektomia), stan po usunięciu żółciaka (gastrektomia), rak trzustki, stan po resekcji kołkiowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II), zwężenie przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu), zespół Słwachmana-Diamonda, stan po ataku ostrego zapalenia trzustki i rozpoczęciu żywienia dojelitowego lub doustnego. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na pankreatynę wlepową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Podmiot odpowiedzialny:** Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 218, 02-676 Warszawa. Niniejsza informacja została przygotowana dnia 14.09.2018 na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Kreon Travix zatwierdzonej 9/2018. Dodatkowe informacje dostępne są w Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 218, 02-676 Warszawa. **KRE-2019-0033** (* dawkiowanie zgodne z ulotką)

Sen

22⁹⁹*



MELATONINA LEK-AM 30 tabletek

Produkt leczniczy • Tabletki, 30 sztuk • Skład: 1 tabletkę Melatoniny LEK-AM zawiera 5 mg, 3 mg, 1 mg melatoniny. **Wskazania:** lek Melatonina LEK-AM Melatonina jest wskazany jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Lek ułatwia także regulację zaburzeń dobowego rytmu snu i czuwania u pacjentów niewidomych. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Melatoniny nie należy stosować po spożyciu alkoholu oraz w okresie ciąży lub laktacji. **Podmiot odpowiedzialny:** Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., ul. Ostrowskowska 14A, 05-170 Zakroczym.

Jama ustna

14⁹⁹*



DENTOSEPT 100 ml

Produkt leczniczy • DentoSept, 4,55 g/5 ml, płyn do stosowania w jamie ustnej. • Skład: 1 ml leku zawiera 0,91 g wyciągu płynnego złożonego (0,65:1) z: kory kory rumianku (*Matricaria recutita* L.), kory dębu (*Quercus* spp.), liścia szalwii (*Salvia officinalis* L.), ziela arniki (*Arnica* spp.), kłącza tataraku (*Acorus calamus* L.), ziela mięty pieprzowej (*Mentha piperita* L.), ziela tymianku (*Thymus* spp.) (2/2/2/1/1/1/1); rozpuszczalnik ekstrakcyjny; etanol 70% (V/V). Zawartość etanolu 60-70% (V/V). **Wskazania do stosowania:** tradycyjny lek roślinny przeznaczony do stosowania u osób w wieku powyżej 6 lat jako środek przeciwbakteryjny, przeciwbakteryjny, odkażający i ściągający, w: stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła, zapaleniu dżięł i jamy ustnej (w tym w zapaleniu języka), powierzchniowym zapaleniu przebiegiem, skłonności do krwawienia z dziąseł, pomocniczo w parodontozie. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, uczulenie na arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae), dawniej złożonych (Compositae), uczulenie na tymianek, szalwię, mięętę lub inne rośliny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae), dawniej wargowatych (Labiatae), uczulenie na korę dębu, kłącze tataraku. **Podmiot odpowiedzialny:** Phytopharm Kłęk SA, Kłęk 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Polska.

Żyłki i obrzęki

19⁹⁹*



VENO COMPLEX PULS 60 tabletek

Suplement diety • Tabletki, 60 sztuk • VENO COMPLEX PULS to suplement diety polecany w szczególności osobom odczuwającym ciężkość i zmęczenie nóg, ze skłonnościami do powstawania obrzęków oraz osobom, które prowadzą siedzący lub stojący tryb pracy i życia. Sklerotyzacja jest również dla osób palących papierosy, nie wykazujących aktywności fizycznej, mających nadwagę oraz osobom o cerze naczynkowej. **Przeznaczenie:** przeznaczony jest dla osób dorosłych. Zalecane spożycie: dorośli 1 tabletkę dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. **Składniki:** substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; suchy wyciąg z ruszczyka kołczastego (*Ruscus aculeatus* L.); metylcholinon hesperydyny; kwas L-askorbinowy (witamina C); substancja przeciwzłybiąca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu; substancja glazurująca – hydroksypropylostearylceluloza; substancja wypełniająca – polielektroza; barwnik – dwutlenek tytanu; substancja glazurująca – glikol polietylenowy; substancja przeciwzłybiąca – talk. **Podmiot odpowiedzialny:** Puls.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.06.2020 do 30.06.2020 lub do wyczerpania zapasów.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



Kości i stawy

39⁹⁹*

TWOJA OBRONA PRZED OSTEOPOROZĄ



Nr 1 W POLSCE
JEDYNY LEK BEZ RECEPTY

* IMS HEALTH udział ilościowy w kategorii wapnia MAT 10/2019.
** IMS Pharmascope, produkty w kategorii wapnia YTD 10/2019.


PROFILAKTYCZNE – UZUPELNIAJĄCO W KOMPLEKSYWYM LECZENIU OSTEOPOROZY

OSTEOPOROZA
Calperos 500, Calperos 1000, jedyna kapsułka twarda Calperos 500 zawiera 200 mg jonów wapnia w postaci 500 mg węgla wapnia (Calcii carbonas). Jedyna kapsułka twarda Calperos 1000 zawiera 400 mg jonów wapnia w postaci 1000 mg węgla wapnia (Calcii carbonas). Wskazania do stosowania: Wskazaniami do stosowania produktu leczniczego Calperos są: stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas laktacji); niska podaż wapnia w żywieniu; zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanałków nerkowych; hipokalcemia z hiperfosfatemią u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej; profilaktyczne – uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy; stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji (rehabilitacji ruchowej) po złamaniach kości; wspomaganie w leczeniu przewlekłej i chorób alergicznych. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. **Hiperkalcemia** spowodowana nadczynnością przytarczyc, niedoczynnością tarczycy, hiperwitaminozą D, nowotworami odpowiadającymi bez przerzutów do kości, nowotworami dającymi przerzuty do kości, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, sarkoidozą, ciężką hiperkalcemią, kamica nerkowa. **Leczenie:** glikozydami naprzystrojenymi. **Podmiot odpowiedzialny:** Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilia Piłster 53, 00-113 Warszawa. PO/CAL/19/0034

teva

Kości i stawy

21⁹⁹*



STRUCTUACTIV 500
60 kapsułek

Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • StructuActiv 500 to wysoka dawka siarczanu chondroityny – 500 mg dla ochrony stawów. Produkt jest odpowiednikiem leku RX dostępnym bez recepty. StructuActiv zawiera wysoką dawkę substancji czynnej. Łagodzi objawy choroby zwyrodnieniowej stawów. Stosowany podczas stanów zapalnych kości i stawów, wspomaga regenerację chrząstki stawowej, łagodzi bóle stawów. Kwaśny siarczan chondroityny jest jednym z podstawowych składników budowy kości i chrząstki. Nadaje chrząstce właściwości mechaniczne i elastyczne. • Producent: Regis Sp. z o.o., ul. W. Sławką 3a, 30-633 Kraków.

Mięśnie i stawy

16⁹⁹*
cena dotyczy op. 100g

ZWALCZA BÓL I STAN ZAPALNY



Olfen HydroZel: 10mg/g, żel 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natrium) oraz substancje pomocnicze. **Bezbarwny** do spożycia, przezroczysty żel o zapachu łązgowym. **WSKAZANIA DO STOSOWANIA:** Olfen HydroZel jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorosli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrżeń lub stłuczeń); ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie tendinow, zapalenie otoczkostawowe, burzki (powyżej 18 lat); ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. **PRZECIWWSKAZANIA:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. W ostroim trzewicy. **Nadwrażliwość** na leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy). **Postępi,** u których wcześniej wystąpił atak astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. **Aktyny** wrzód trawienicy. Stosowanie na otwarte rany, oparzenia, infekcje skóry lub egzemę. Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat jest przeciwwskazane. **PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:** Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA Houten Holandia. **INFORMACJI UDZIAŁA:** Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Ornińska 12, 02-623 Warszawa, tel. +48 22 345 93 00, fax: +48 22 345 93 01, www.teva.pl, 10/01N/19/0026

teva

Mięśnie i stawy

23⁹⁹



DIFORTAN
żel, 100 g

Produkt leczniczy • Żel, 100 g • Wskazania do stosowania: Difortan jest wskazany u dorosłych w miejscowym leczeniu łagodnych lub umiarkowanych bólów mięśni; stłuczeń; bólu pourazowego; łagodnego i umiarkowanego bólu reumatycznego (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie stawów); łagodnego i umiarkowanego bólu stawów; miejscowego leczenia zapalenia błony maziowej, (niezakaźnego) zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgien; umiarkowanego stanu zapalnego pochodzenia mięśniowo-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciąża; dzieci; miejsca, w których występuje wyprysk, otwarte rany, wrzody lub urazy. • **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** US Pharmacia Sp. z o.o., Lek dostępny bez recepty (OTC).

Mięśnie i stawy

19⁹⁹

PROFESJONALNIE ZWALCZA BÓL MIĘŚNI I STAWÓW



IBUPROM SPORT Żel 100g, 100 kapsułek. Wskazania do stosowania: Ibuprom Sport Żel jest wskazany do miejscowego leczenia: dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat: pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrżeń lub stłuczeń); ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie tendinow, zapalenie otoczkostawowe, burzki (powyżej 18 lat); ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. W ostroim trzewicy. Nadwrażliwość na leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy). Postępi, u których wcześniej wystąpił atak astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Aktyny wrzód trawienicy. Stosowanie na otwarte rany, oparzenia, infekcje skóry lub egzemę. Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA Houten Holandia. Informacji udziała: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Ornińska 12, 02-623 Warszawa, tel. +48 22 345 93 00, fax: +48 22 345 93 01, www.teva.pl, 10/01N/19/0026

Ból i stany zapalne

9⁹⁹*



DICLOZIAJA
żel, 100 g

Produkt leczniczy • Żel, 100 g • Skład: 1 gram Diclozija zawiera 11,6 mg diklofenaku dietyloamoniowego (Diclofenacum diethylammonium), co odpowiada 10 mg diklofenaku sodowego. • **Wskazania:** młodzież powyżej 14 lat – leczenie krótkotrwałe; - miejscowe leczenie objawów bólu w ostrych nadwyrżeniach, skręcaniach lub stłuczeniach wywołanych tępymi urazami. Dorosli: - pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów powstałych wskutek skręceń, nadwyrżeń lub stłuczeń, - bóle pleców, - ograniczone stany zapalne tkanek miękkich np. zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty, - ograniczone i łagodne postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. • **Przeciwwskazania:** • w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, glikol propylenowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą; - u pacjentów, u których po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wystąpiły napady astmy, pokrzywka, ostre zapalenie błony śluzowej nosa; - u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat; - w trzecim trymestrze ciąży; • **Podmiot odpowiedzialny:** ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o., ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.06.2020 do 30.06.2020 lub do wyczerpania zapasów.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



Rzucanie palenia



44^{99*}

NICORETTE COOL BERRY |
aerazol, 150 ml

Produkt leczniczy • Aerazol, 150 ml • Skład: jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. • **Wskazania:** Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawienia, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucenia palenia. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. • **Podmiot odpowiedzialny:** McNeil AB.

Trawienie

suplement diety
hepatil®

Wątroba jest tylko jedna



19^{99*}

HEPATIL® suplement diety, zawiera L-asparaginian L-ornityny (100 mg) oraz cholinę (35 mg). Dzięki zawartości choliny HEPATIL® wspomaga pracę wątroby i przyczynia się do właściwego metabolizmu tłuszczów. Teva Operations Polska Sp. z o.o. **SUPLEMENT DIETY**

teva

PO/HPT/19/0039

Witaminy i minerały

14^{99*}

NOWOŚĆ

KOSMICZNE WSPARCIE ZDROWEGO ROZWOJU

EDYCJA LIMITOWANA

Vibovit KOSMICZNE ŻELKI

100% MULTIWIAMINA BIAŁO BIAŁO

NR1 W POLSCE

EDYCJA LIMITOWANA

1. Witamina D potrzebna jest dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. 2. Najczęściej wybierane multivitaminy dla dzieci w Polsce. Sprzedaż IMS, 04A2+04B2, MAT 10/19. PO/VBV/19/0039 **SUPLEMENT DIETY**

teva

Witaminy i minerały

12^{99*}



PLUSSSZ ACTIVE 100% ENERGY COMPLEX
20 tabletek musujących

Suplement diety • Tabletki, 20 sztuk • Plusssz Active 100% Energy Complex to specjalistyczny preparat zawierający naturalne ekstrakty roślinne: guaranę, bakopę, yerba mate. Ponadto posiada kofeinę, magnez oraz kompleks 10 najważniejszych witamin w ilościach zapewniających 100% dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia dla osób dorosłych. Polecany osobom odczuwającym zmęczenie i znużenie oraz w chwilach zwiększonego wysiłku fizycznego i umysłowego. • **Producent:** „Polski Lek” S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice.

Witaminy i minerały

ZADBAJ O SWOJĄ ODPORNOŚĆ!

od 8^{99*}



PLUSSSZ 100% MULTIWIAMINA
20 tabletek musujących

Linia Plusssz 100% Multiwitamina to specjalistyczne preparaty, zawierające między innymi **kompleks 10 najważniejszych witamin** w ilościach zapewniających **100% dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia dla osób dorosłych w 1 tabletkę**. **Bez dodatku cukru, z sokiem owocowym w proszku!**

Witaminy i minerały

9^{99*}

Suplement diety
bodymax®



Wypróbuj nowości



Tabletki musujące:
Bodymax PRZYPŁYW ENERGII - stawia na nogi
Bodymax ŚWIEŻY UMYŚŁ - ożywia umysł i ciało
Bodymax ŻELAZNA KONDYCJA - dotlenia organizm

*Działanie żel-żelazna.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązuje w okresie od 01.06.2020 do 30.06.2020 lub do wyczerpania zapasów.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



Hemoroidy

**Szybka ulga.
Skuteczne leczenie
hemoroidów.***

23⁹⁹*



PROCTO-GLYVENOL |
10 czopków

PROCTO-GLYVENOL |
krem, 30 g

Produkt leczniczy • Czopki - 10 sztuk, krem - 30 g • Może być stosowany przez kobiety w ciąży od 4. miesiąca oraz w okresie laktacji*. • **Opakowanie:** czopki - 10 sztuk, krem - 30 g. *Charakterystyka Produktu Leczniczego Procto-Glyvenol, data zatwierdzenia 10/2016. Produkt leczniczy (A) Procto-Glyvenol, (50 mg + 20 mg)/g, krem doodbytniczy. 1 g kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozylu i 20 mg lidokainy chlorowodoru. (B) Procto-Glyvenol, 400 mg + 40 mg, czopki. 1 czopek zawiera 400 mg tribenozylu i 40 mg lidokainy. • **Wskazanie:** (A,B) Miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. • **Przeciwwskazania:** (A,B) Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na inne środki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej. • **Podmiot odpowiedzialny:** (A,B) Recordati Ireland Ltd., Raheens East, Ringaskiddy, Co. Cork, Irlandia.

PGL/2017-11/68

Zgaga



11⁹⁹*

POLPRAZOL MAX |
14 kapsulek

Produkt leczniczy • Kapsułki, 14 sztuk • Skład i postać: Każda kapsułka dojelitowa twarda zawiera 20 mg omeprazolu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, sól, erytryna (E127). Każda kapsułka zawiera 80,02 mg sacharozy i mniej niż 1mmol sodu (23 mg) na dawkę to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu” oraz erytrynę (E127). • **Wskazania:** Polprazol Max jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. • **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Omeprazolu podobne jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej nie należy podawać jednocześnie z nelfinawirem. • **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa; tel:+48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02; www.polpharma.pl. ChPL: 2018.12.28.

Katar

9⁹⁹*

teva | Zdrowie
w Dobrej Cenie

PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

**OBJAWOWE LECZENIE
NIEDROŻNOŚCI W WYNIKU:**

- ZAPALENIA BŁONY ŚLIZWEJ NOSA,
- ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH.

Xylometazolin Teva, 1 mg/ml, nosz, roztwór. Każda dawka noszeli (co odpowiada 0,09 ml noszeli do nosa, roztworu) zawiera 0,09 mg xylometazolinu chlorowodoru. **Wskazania do stosowania:** Katarale, objawowe leczenie niedrożności nosa spowodowanej zapaleniem błony śluzowej nosa lub zapaleniem zatok przynosowych. Xylometazolin Teva, 1 mg/ml jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 10 lat i starszych. **Przeciwwskazania:** Produkt leczniczy nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na xylometazolinu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u osób po zabiegu przekładowego usunięcia przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z obniżeniem opory twardzi, u pacjentów z ostrym zapaleniem błony śluzowej nosa (bólis stnia) - za wyjątkiem badań diagnostycznych w celu rozpoznania występującego niedrożności nosa lub zorkowego niedrożności nosa. Xylometazolin Teva, 1 mg/ml nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat. **Podmiot odpowiedzialny Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.** PO/X11/19/0014



Żywnienie medyczne

29⁹⁹*
4 x 125ml



**Twoje posiłki
w walce z chorobą**

Odżywia, dzięki temu wspiera leczenie i proces rehabilitacji
✓ Składniki odżywcze skoncentrowane w najmniejszej butelce*



Nutridrink to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą. Stosować pod nadzorem lekarza. Nutricia Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa. NEUR/10/03/2020 * spośród innych produktów do żywienia medycznego dostępnych na polskim rynku (10/2019)

www.posilkwchorobie.pl
Zapytaj lekarza lub farmaceutę o Nutridrink

Pielęgnacja ciała



37⁹⁹*

**CETAPHIL MD
DERMOPROTEKTOR**
250 ml

Dermokosmetyk • Balsam, 250 ml • Wskazania: balsam nawilżający Cetaphil MD jest polecany do codziennego nawilżania skóry suchej lub wrażliwej, szczególnie w przypadku: trądzika pospolitego (młodzieńczego), trądzika różowatego, łuszczyca, atopowego zapalenia skóry. • **Producent:** Galderma.



37⁹⁹*

**CETAPHIL EM
EMULSJA**
250 ml

Dermokosmetyk • Emulsja, 250 ml • Wskazania: emulsja micelarna Cetaphil do mycia twarzy jest szczególnie polecana w przypadku: skóry suchej, skóry wrażliwej, skóry z trądzikiem pospolitym (młodzieńczym) i różowatym, skóry przed i po zabiegach dermatologicznych, demakijażu twarzy i okolic oczu. Może być również stosowany u dzieci od pierwszego dnia życia. • **Producent:** Galderma.

Żyłaki i obrzęki

21⁹⁹*



DIH MAX COMFORT |
14 kapsulek

Podmiot leczniczy • Kapsułki, 14 sztuk • Skład: jedna tabletkowa powlekana zawiera 1000 mg zmikrozonowanej diosminy (Diosminum). • **Postać farmaceutyczna:** tabletkowa powlekana. • **Wskazania do stosowania:** objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych: bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, żyłaki kończyn dolnych, poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajęczki naczyniowe, obrzęki nóg (opuchlizna/puchnięcie nóg). Objawowe leczenie żyłaków odbytu. • **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną diosminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Podmiot odpowiedzialny:** PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A., 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.06.2020 do 30.06.2020 lub do wyczerpania zapasów.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.