

NR 6/2021

# katalog Produktów

Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego

## Mięśnie i stawy

33<sup>99</sup>\*



## Probiotyki

18<sup>99</sup>\*



**ENTEROL** 10 saszetek

**Produkt leczniczy** • Saszetki, 10 sztuk • **Skład:** jedna saszetka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków *S. boulardii* CNCM I-745. **Saszetka:** • **Substancje pomocnicze:** Laktuloza jednowodna, fruktoza, krzemionka koloidalna bezwodna (Aerosil 200), aromat owocowy. • **Postać farmaceutyczna:** kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. • **Wskazania:** leczenie ostrej biegunki infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem *Clostridium difficile*, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. • **Podmiot odpowiedzialny:** BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja.

18<sup>99</sup>\*



**ENTEROL** 10 kapsulek

**Produkt leczniczy** • Kapsułki, 10 sztuk • **Skład:** jedna kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków *S. boulardii* CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktuloza jednowodna i fruktoza (saszetki). • **Postać farmaceutyczna:** kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. • **Wskazania:** leczenie ostrej biegunki infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem *Clostridium difficile*, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą; pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. • **Podmiot odpowiedzialny:** BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja.

## Alergia

10<sup>99</sup>



**ALERIC DESLO ACTIVE** 10 tabletek

**Produkt leczniczy** • Tabletek, 10 sztuk • **Skład:** Desloratadyn 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej • **Wskazania do stosowania:** łagodzenie objawów związanych z: - alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa po krzywicy. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę. • **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia sp. z o.o.

## Mięśnie i stawy

23<sup>99</sup>\*

NOWOŚĆ!



**MAX** stężenie  
**diklofenaku 2%**  
Na ból mięśni  
i stawów\*\*

100g

teva

\*W porównaniu do Olfen Hydrozel. \*\*Olfen Max jest wskazany w miejscowym leczeniu objawowym bólu np. mięśni lub stawów w ostrej nadwrażliwości, skrępcach lub stłuczeniach wywołanych tępych urazami. Olfen Max, 20 mg/g, żel, 1 gram żelu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietylamoniowego (Diclofenacum diethylammonium), co odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego. Jednorodny żel w kolorze białym do smarowania. Wskazania do stosowania: Dorosli i młodzieży w wieku od 14 lat. Miejsce leczenia objawowe bólu w ostrej nadwrażliwości, skrępcach lub stłuczeniach wywołanych tępych urazami. U młodzieży w wieku od 14 lat przeznaczony do krótkotrwałego stosowania. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą; pacjenci, u których w wywiadzie wystąpiły reakcje nadwrażliwości, takie jak astma, skurcz oskrzeli, pokrzywka, ostre zapalenie błony śluzowej nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); na otwarte rany, stany zapalne lub infekcje skórne, a także na skórę z oparzeniami i blonami śluzowymi, w ostatnim trymestrze ciąży, u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandia. **Informacji udziela:** Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Olskańska 12, 02-823 Warszawa, tel: +48 22 345 93 00, fax: +48 22 345 93 01, www.Teva.pl. OLF-PL-00080-05-21

## Witaminy i minerały

19<sup>99</sup>\*



EDYCJA SPECJALNA  
NA DZIEŃ DZIECKA  
Zestaw BODYMISIE BODYMISIE  
i plastry Salvequick.\*

Bodymis BODYMISIE to multivitamina w formie pysznych żelków w misce, które wspierają odporność\*. Bez zawartości cukrów. Naturalne aromaty. **Właściwości składników:** Wit. A, B6, B12, C, D wspomagają utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Wit. D jest potrzebna do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wit. E jest szczególnie ważna przy przeziębieniu, ponieważ wspiera produkcję przeciwciał, które łagodzą działanie wolnych rodników powstających podczas infekcji

## Alergia

18<sup>99</sup>



**ACATAR ALLERGY** 10 ml

**Produkt leczniczy** • Aerosol, 10 ml • **Skład:** każdy ml roztworu zawiera 1 mg azelastyny chlorowodoru, aerosol do nosa, roztwór. • **Wskazania do stosowania:** Azelastyna jest wskazana do leczenia objawowego sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (np. katar sienny) i zaostrzeń niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat. • **Przeciwwskazania:** dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.06.2021 do 30.06.2021 lub do wyczerpania zapasów.

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.06.2021 do 30.06.2021 lub do wyczerpania zapasów.

**Nadkwaśność i zgaga**

**999\***



**ORTANOL MAX** 14 kapsulek

**Produkt leczniczy • Kapsułki, 14 sztuk • Skład:** 1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu i substancje pomocnicze, m.in. 177 mg laktozy. • **Wskazania:** leczenie objawów refluksu żołądkowo-przelykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u dorosłych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu nie należy stosować jednocześnie z nelfinawirem. • **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.

Sygnatura: ORTM/001/01-2020

**Nadkwaśność i zgaga**

**999\***



**BIOPRAZOL BIO MAX** 14 kapsulek

**Produkt leczniczy • Kapsułki, 14 sztuk • Skład:** 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde. Jedna kapsułka twarda zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolium). • **Wskazania:** Bioprazol® Bio Max jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przelykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować jednocześnie z nelfinawirem. • **Podmiot odpowiedzialny:** Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

**Układ pokarmowy**

**1899\***



**DOPPELHERZ MED NA DRAŻLIWE JELITA** 30 tabletek

**Wyrób medyczny • Tabletki, 30 sztuk •** Wyrób medyczny wskazany do leczenia zespołu jelita drażliwego charakteryzującego się: bólem brzucha, wzdęciami, zaburzeniami rytmu wypróżnień (zaparcia, biegunki lub ich naprzemienne występowanie), dyskomfortem w jamie brzusznej. Doppelherz med Na drażliwe jelita poprzez mechaniczne działanie ochronne, fizycznie współdziała z błoną śluzową jelit, tworząc mukoadhezyjny film, który chroni błonę śluzową przed kontaktem z substancjami drażniącymi, a jednocześnie pomaga usunąć niebezpieczne substancje zapobiegając ich wchłanianiu. • **Składniki aktywne:** Doppelherz med Na drażliwe jelita zawiera 5 składników aktywnych: zeolit, ałoes, prawoślaz, rumianek, tyndalizowane bakterie.

**Układ pokarmowy**

**7549\***

**4599\***

**2299\***



**IBEROGAST** płyn, 20 ml, 50 ml, 100 ml

**Produkt leczniczy • Iberogast®** to lek, który czerpie z mocy 9 wyciągów roślin leczniczych. Zioła te współdziałają, łagodząc wiele czynnościowych dolegliwości żołądkowo-jelitowych: - ból i skurcze brzucha, - uczucie pełności, - wzdęcia i gazy, - zgaga i nudności. Posiada przebadaną skuteczność w leczeniu Zespołu Jelita Drażliwego oraz Dyspepsji (Niestrawności) Czynnościowej. • **Wskazania:** leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. • **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. • **Podmiot odpowiedzialny:** Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URLP/MiPB. V6/13.09.2019/MK. L.PL.MKT.01.2020.7487

**Zaparcia**

**1799\***



**COLONORMAX EXTRA** 300 g

**Suplement diety • Sól, 300 g •** To suplement diety, który zawiera łupinę nasienną babki jajowatej (Plantago ovata), inulinę z cykarii (Cichorium intybus) oraz bakterie probiotyczne z rodzaju Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis. Łupina nasienna babki jajowatej (Plantago ovata) uzupełnia dietę w naturalny błonnik, który pęczniejąc w przewodzie pokarmowym korzystnie wpływa na perystaltykę jelit, ułatwiając wypróżnianie. Surowiec ten w naturalny sposób oczyszcza organizm z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii, stanowi doskonale uzupełnienie kuracji odchudzających oraz pomaga kontrolować stężenie cholesterolu we krwi. Inulina z cykarii (Cichorium intybus) pomaga w kontroli wagi przez co ułatwia odchudzanie, wspomaga zdrowie jelit oraz obniża poziom cukru we krwi. • **Zalecana dzienna porcja:** 1 łyżeczkę (5g) rozpuścić w 1/2 szklanki wody. Popić dodatkową porcją wody lub innego płynu. Stosować 2 razy dziennie.

**Żywność medyczna**

**749\***

1 x 125ml



**NUTRICIA Nutridrink**

Odżywia i dzięki temu wspiera odbudowę sił po chorobie

- ✓ Marka najczęściej polecana przez lekarzy\*
- ✓ Niezbędne składniki odżywcze skoncentrowane w najmniejszej butelce\*\*

Zapytaj farmaceutę o Nutridrink

Nutridrink. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w warunkach szpitalnych i przyrodniczych związanych z chorobą. Stosować pod nadzorem lekarza. Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bohowiecka 8, 00-728 Warszawa. ADU/NEUR/2024/2021

\*w kategorii „Odżywność żywności medycznej”. ©2014 Nutricia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nutricia i Nutridrink są znakami towarowymi Nutricia i jej afiliacji. All rights reserved.

\*\*według danych przedstawionych w opisie medycznego dołączonym do pakietu (03/2020)

**! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**

Cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.06.2021 do 30.06.2021 lub do wyczerpania zapasów.



**Ból**



**15<sup>99</sup>\***

**KETONAL ACTIVE**   
20 tabletek



**13<sup>99</sup>\***

**KETONAL SPRINT**   
12 saszetek

Ketonal Active, 50 mg, kapsułki twarde/ Ketonal Sprint, 25 mg/50 mg, granulad do sporządzania roztworu doustnego, w saszetce.  
**• Skład:** Ketonal Active: 1 kapsułka zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej. Ketonal Sprint: 1 saszетка zawiera 25 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (40 mg)/1 saszетка zawiera 50 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (80 mg). **• Wskazania:** Ketonal Active: Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, ból głowy. Ketonal Sprint: Lek jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat w krótkotrwałym objawowym leczeniu ostrego bólu o lekkim lub umiarkowanym nasileniu, tj.: ból głowy, ból zębów, bolesne miesiączkowanie, ból spowodowany lekkimi nadwyrzżeniami i zwichnięciami. **• Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, kwas acetylosalicylowy (ASA) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (w tym występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub inne reakcje alergiczne wywołane przez ketoprofen, ASA lub inne NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych. Astma w wywiadzie. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynną chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owróżdzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria. **• Podmiot promujący:** Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.

**Ból i stany zapalne**



**DICLOZIAJA**   
100 g, żel

**Produkt leczniczy • Żel, 100 g • Skład:** 1 g żelu zawiera 11,6 mg diklofenaku dietyloamoniowego (Diclofenacum diethylammonium), co odpowiada 10 mg diklofenaku sodowego. **• Wskazania:** Młodzież powyżej 14 lat - leczenie krótkotrwałe: - miejscowe leczenie objawowe bólu w ostrych nadwyrzżeniach, skręceniach lub stłuczeniach wywołanych tępymi urazami. Dorosli: - pourazowe stany zapalne ścięgna, więzadła, mięśni i stawów powstałe wskutek skręceń, nadwyrzżen lub stłuceń, - bóle pleców, - ograniczone stany zapalne tkanek miękkich np. zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty, - ograniczone i łagodne postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. **• Przeciwwskazania:** - nadwrażliwość na substancję czynną, glikol propylenowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą, - u pacjentów, u których po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wystąpiły napady astmy, pokrzywka, ostre zapalenie błony śluzowej nosa, - u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat, - trzeci trymestr ciąży. **• Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:** ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

**Sen**



**23<sup>99</sup>\***

**MELATONINA**   
30 tabletek

**Produkt leczniczy • Tabletki, 30 sztuk • Skład:** 1 tabletkę Melatoniny LEK-AM zawiera 5 mg, 3 mg, 1 mg melatoniny. **• Wskazania:** lek Melatonin LEK-AM jest wskazany jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Lek ułatwia także regulację zaburzeń dobowego rytmu snu i czuwania u pacjentów niewidomych. **• Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Melatonin nie należy stosować po spożyciu alkoholu oraz w okresie ciąży lub laktacji. **• Podmiot odpowiedzialny:** Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., ul. Ostrzykowska 14A, 05-170 Zakroczym.

**Uspokojenie**



**16<sup>99</sup>\***

**PERSEN FORTE**   
20 kapsułek twardej

**Produkt leczniczy • Kapsułki twarde, 20 sztuk • Wskazania do stosowania:** tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Persen forte jest lekiem roślinnym o działaniu uspokajającym, stosowanym tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu. **• Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, mentol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nie zaleca się stosowania produktu Persen forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak dostępnych danych w tej grupie wiekowej. Zaleca się ostrożność podczas stosowania preparatów zawierających liście mięty pieprzowej lub ich przetwory u pacjentów z kamicą żółciową i innymi chorobami dróg żółciowych. Pacjenci z refluksem żołądkowo-przełykowym powinni unikać stosowania mięty, gdyż może ona nasilić zgagę. Kapsułki Persen forte zawierają laktozę. Nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. **• Podmiot odpowiedzialny:** Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, 86, Bulgaria Blvd, 1680 Sofia, Bulgaria.

**Jama ustna**



**19<sup>99</sup>\***

**DENTOSEPT PEN**  
żel, 3,3 ml

**Wyrób medyczny • Żel, 3,3 ml • Skład:** woda, polimery syntetyczne i naturalne, polisacharydy adhezyjne otrzymane z mdrzewia, Laureth - 9, środki konserwujące, aromaty. **• Przeznaczenie wyrobu:** Unikalne, bezbolesne leczenie zmian chorobowych (w tym aft) i uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, natychmiastowa ulga w bólu, długotrwałe działanie przeciwbólowe już od pierwszego zastosowania, bariera ochronna, izolacja uszkodzeń i zmian chorobowych, szybkie gojenie. **• Wytwórca:** Oystershell NV, Nijverheidsweg 10, 9820 Merelbeke, Belgium.

**Katar**



**37<sup>99</sup>\***

**SINUPRET EXTRACT**   
20 tabletek

**Nazwa produktu leczniczego:** Sinupret extract tabletki drażowane. Produkt złożony. **• Postać farmaceutyczna :** Tabletki drażowane, 20 sztuk **• Wskazania do stosowania:** Sinupret extract jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrych niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych (ostrego niepowikłanego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych). **• Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba wrzodowa. **• Podmiot odpowiedzialny:** Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. **• Informacji o leku udziela:** Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.

**! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**

